

ডি-টেন ১০জি

ডায়াজিনন ১০ জি

সাবধানতা : গন্ধ নেয়া, গায়ে লাগানো, গিলে খাওয়া, ছিটানোর সময় পানাহার বা ধূমপান নিষেধ।
বাতাসের বিপরীতে বা খালিগায়ে ছিটাবেন না। কাজের শেষে কাপড় ও শরীর সাবান পানি দিয়ে
ধুয়ে ফেলুন। মানুষ ও পশুখাদ্য হতে দূরে রাখুন। খালি প্যাকেট অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না,
ছিদ্র করে মাটির নীচে পুঁতে রাখুন। **ডি-টেন ছিটানো ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে ২৪ ঘন্টা ঢুকবেন না,
গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী ও ঢুকতে দেবেন না।**

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : মাংসপেশী মোচড়ানো, তলপেট ব্যথা, বমি বমি ভাব, অস্থিরতা, ঝাঁপসা দৃষ্টি,
চোখের তারার সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, পাতলা পায়খানা, খিঁচুনি ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা : বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্রই কীটনাশক নিয়ে কাজ করা বন্ধ করুন।
কাপড়-চোপড় খুলে ফেলুন। সমস্ত শরীর সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখে লাগলে প্রায় ১৫
মিনিট পরিষ্কার পানি ছিটান। খোলা জায়গায় রোগীকে শুইয়ে রাখুন। সত্বর ডাক্তারের পরামর্শ
নিন।

প্রতিষেধক : এট্রোপিন সালফেট।

চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য : ২-৪ এম জি (পূর্ণ বয়স্কের জন্য) এট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন এট্রোপি-
নাইজড না হওয়া পর্যন্ত ৫-১০ মিনিট পর পর শিরায় দিতে হবে। ২৪-৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত এট্রোপিন-
নাইজড করে রাখতে হবে। বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়ার ৬ ঘন্টার মধ্যে ইনজেকশন দেয়া আরম্ভ
করলে সাথে অক্সাইম জাতীয় ইনজেকশন (টেক্সোগোনি/ পিএএম) দেয়া যেতে পারে।

রেজিঃ নং : এপি ১৯৫০

প্রস্তুতকারক : বিজিয়াং হেভেন পেস্টিসাইড এন্ড কেমিক্যাল কোং. লি. চায়না।

রেজিঃ নং, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী :
ইস্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস লিঃ
৪২/১ সিটি ইন্ডাস্ট্রিয় এড্., হাসান হোজিসে (১০ম তলা),
ডাবা-১০০০, বাঙ্গালেশ।
স্বাক্ষরিত : বারমাইল, ডেওয়ানা, তুর্কিয়া।
ফোন : ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০

ব্যাচ নং :
উৎপাদনের তারিখ :
ব্যবহারের সময়সীমা :
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য :

ডি-টেন ১০জি

ডায়াজিনন ১০ জি

১ কেজি

প্রতি কিলোগ্রামে ১০০ গ্রাম ডায়াজিনন আছে।

ডায়াজিনন = ও, ও-ডাইইথাইল ও -

(২-আইসোপ্রোপাইল-৬-মিথাইল-পাইরিমিডিন-৪-ইল) ফসফোরোথাইওয়েট।

ব্যবহারের আগে নিম্নের নির্দেশাবলী পড়ে নিন।

ডি-টেন অরগানোফসফরাস জাতীয় দানাদার কীটনাশক। ডি-টেন-এর কার্যকারিতা ৩-৪
সপ্তাহ স্থায়ী হয়। ডি-টেন ছিটানোর পর ২১ দিনের মধ্যে ক্ষেত্রে পশু-পাখি ঢুকতে দিবেন না
এবং ফসল সংগ্রহ করবেন না।

অনুমোদিত মাত্রা : একর প্রতি ৬.৭২ কেজি।

ব্যবহার বিধি : ধানের বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায়
ডি-টেন ছিটাতে হবে। ছিটানোর সময় জমিতে ২-৪ ইঞ্চি আবদ্ধ পানি থাকা প্রয়োজন। পানি
শুকিয়ে গেলে স্বাভাবিক সেচ দিন।

ফসলের নাম	অনিষ্টকারী পোকার নাম	অনুমোদিত প্রয়োগমাত্রা
		একর প্রতি
ধান (Rice)	বাদামী গাছ ফড়িং (BPH)	৬.৭২ কেজি



“বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার
মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।”